

پرو سٹیکھو می (غدو دمثانہ کا سرجیکل خاتمه)



Revenue from these services is spent on the treatment of poor cancer patients.

 **Shaukat Khanum**
Memorial Cancer Hospital
and Research Centre

Information for Patients

ہمیں امید ہے کہ یہ کتابچہ آپ کو اکثر جوابات دے سکتی ہو اُن چیزوں کے بارے میں جو آپ کو پریشان کرتی ہوں یا سمجھنے آئی ہوں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی معلومات درکار ہے اس پر وسیع کے بارے میں آپ نرنسگ سناف یا ڈاکٹرز سے رجوع کر سکتے ہیں۔

میں گھر جانے کے لئے کب فٹ ہوں گا؟

ٹرانس یو تھرل پرو سٹیکھو یا آپریشن کے بعد عموماً مرضیں تیرے یا چوتھے دن گھر جاسکتا ہے۔ اگر اوپن آپریشن ہوا ہوگا تو اس میں زخم موجود ہوگا اور ایک ہفتے لگ سکتا ہے۔

میں گھر کیسے جاؤں گا؟

اگر آپکے پاس اپنی سر انپورٹ موجود ہے تو آپ اپنے عزیز واقر کو کال کر کے نرنسگ سناف کے بتائے گئے اوقات میں آکر لے جانے کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تو آپ اپنے بیویں کے ذریعے بھی گھر جاسکتے ہیں۔ البتہ اس کا آپ نرنسگ سناف کو ایڈوانس میں بتانا ہوگا تاکہ اس کا بروقت انتظام کیا جاسکے۔

گھر پہنچ کر مجھے کیا محسوس ہوگا؟

پرانے والی سخت اور طاقت محسوس ہونے میں اور اس دورانیہ میں اپنے اوپر زیادہ بو جھ جس کی وجہ سے آپ زیادہ تھک جائیں گیں ڈالنا چاہئے۔ اگر آپ فوری کر رہے ہیں تو آپ کو مزید 3-2 ہفتے کام سے چھٹی کیلئے چاہئے ہوں گے۔ یہ بات اس پر بھی محضرا ہے کہ آپکے کام کی نوعیت کیا ہے اور وہ کتنی طاقت درکار کرتا ہے۔ اگر آپ ریڑاڑیں تو باترتیب ہر دن تھوڑا زیادہ کام کریں مگر بہت زیادہ نہیں۔

گھر جانے کے بعد کوئی پیچیدگی جس کا مجھے خیال رکھنا چاہئے؟

اصولی طور پر دو پیچیدگیاں ہیں جن کا آپ گھر جانے کے بعد 3-2 ہفتے خیال رکھنا پڑتا ہے۔
☆ پیشاب میں خون آنا:

صح اٹھ کر جب آپ اپنا پہلا پیشاب کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہلاخون کا رنگ اس میں ہو۔ یہ رنگ ختم ہو جانا چاہئے جب آپ پورے دن میں پانی یا مشروب پینا شروع کر دیں گے۔ البتہ آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ خون کا رنگ ہو یا بہت بھاری رنگ ہو تو آپ جلدی سے 2 پنٹ (آدھا لیٹر) مشروب یا پانی پیں اور اپنے (جزل فریشن) ڈاکٹر سے رجوع کریں جو آپ کو مکانہ طور پر اپنی بائیو نکد دے گا۔

☆ پیشاب کرنے میں دشواری ہونا:

اگر پیشاب کرتے وقت بلکل سی چھین یا جلن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا فلکیشن ہے۔ آپ اپنے (جزل فریشن) ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔

غدو دیمانہ (پروستیٹ) کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟

غدو دیمانہ ایک عضو ہے جو پیشاب کی نالی کے گرد ہوتا ہے اسکا بڑھتا ہوا غدو دیمانی کے سوراخ کو بیگ کر سکتا ہے اور مردوں کو پیشاب کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔

آپکو غدو دیمانہ کے سر جیکل خاتمہ (پروستیکٹومی) کی ضرورت کیوں ہے؟
اس غدو دیمانہ کے سر جیکل خاتمہ (پروستیکٹومی) کی ضرورت کیوں ہے؟
ایسا غدو دیمانہ کے سر جیکل خاتمہ (پروستیکٹومی) کی ضرورت کیوں ہے؟
یا پیشاب کرنے میں زیادہ مشکل ہو۔ وہ میں سے ایک مرد کو پروستیکٹومی کی ضرورت پڑتی ہے۔

یہ طرح کا آپریشن ہوگا؟

آپریشن 1:

اس آپریشن کو "ٹرانس یوریتھرل پروستیکٹومی" (TURP) (پیشاب کی نالی کے راستے سے غدو دیمانہ کا بغیر ختم کے سر جیکل خاتمہ) کہتے ہیں۔ 80-90% غدو دیمانہ کا حصہ کاٹ دیں گے مگر باہر کی جلد (جملی) کو رہنے دیں گے۔ یہ کام (آپریشن) ڈاکٹر کیمے کے ساتھ جراحی والے آئے، جسے ریسکو سکوپ (Resectoscope) کہتے ہیں سے کرتے ہیں۔

آپریشن 2:

اس قسم کا آپریشن عموماً ان مریضوں پر کیا جاتا ہے جہاں غدو دیمانہ کافی بڑھا ہوا ہو۔ یہ "اوپن پروستیکٹومی" کہلاتا ہے۔ اور 10-15% کیسز میں ہوتا ہے۔ اس آپریشن میں ٹانکے لگتے ہیں، جو کہ 7-5 دن بعد رہتے جاتے ہیں۔

کیا آپ کو درد ہوگا؟

نہیں۔

☆ آپریشن سے پہلے آپ کو سُن کرنے والی دوالاگانی جائے گی۔

☆ ریڑھ کی بڑی کے نچلے حصے میں سُن کرنے والا نجیکشنا دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے نچلے (کرسے نیچے) حصے کو سُن کر دیتا ہے یا حساس 4-6 گھنٹے تک رہتا ہے اور اسکے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔

آپریشن کتنا مبارکہ ہوتا ہے؟

آپریشن تھیٹر میں آنے کے بعد سے والپس جانے تک 45 منٹ لگتے ہیں۔

آپریشن کے بعد کیا محسوس ہوگا؟

جہاں سے آپکا نمودر کاٹ کر نکلا جاتا ہے وہاں کی سطح پر خون اور خون کے لوقرے بن سکتے ہیں۔ یہ خون کے لوقرے پیشاب کی نالی کو بند کر سکتے ہیں اور اس لئے عضوہ تناول میں ایک پلاسٹک ٹیوب (کاٹھیٹر) کی مدد سے ہٹائے جاتے ہیں۔ ہتھوڑی دیر بعد اس ٹیوب کو نہک والے پانی سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ خون کے لوقرے نہ بین۔ اس ٹیوب کی وجہ سے عضوہ تناول میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ پیشاب کرنا چاہتے ہوں۔ اس احساس کو روکنے کی اور آرام کرنے کی کوشش کریں۔

مثانے میں پلاسٹک کی ٹیوب (کاٹھیٹر ٹیوب) کب نکالی جائے گی؟

جیسے ہی پیشاب میں خون آنا بند ہو جائے گا تو یہ ٹیوب نکال دی جائے گی۔ یہ اکثر آپریشن کے 48-72 گھنٹے بعد ہو جاتا ہے۔ آپ کو 4-2 لیٹر پانی ہر دن زیادہ پینا پڑے گا اور صرف اسی طرح سے آپکے پیشاب سے خون صاف ہو گا۔

میں اتنا پانی یا مشروب کیسے پئوں گا؟

یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ اتنا سارا پانی پیشیں۔ اس طرح آپ کو بچولا ہوا اور اٹھی آنے کا احساس ہو گا۔ اس کے برکس آپ سارے دن میں ہتھوڑا پانی یا مشروب مسلسل پینتے رہیں۔

کس قسم کا مشروب پی سکتے ہیں؟

پانی سب سے بہترین ہے۔ پھلوں کا رس بھی استعمال کیا جاسکتا ہے مگر اگر آپ کو ذیابتیں کا مرض ہے تو یہ خیال ریکھیں کہ اس میں جھینی نہ ہو۔ کاربو بیڈ مشروبات بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں مگر ان کی زیادتی اکثر پیٹ میں زیادہ ہوا ہنگے کا باعث ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو "بچولا ہوا" محسوس ہو سکتا ہے۔

کیا کاٹھیٹر ٹیوب (مثانے میں ٹیوب) نکالتے وقت درد محسوس ہوتا ہے؟

نہیں، یہ ٹیوب آپ کے مثانے میں ایک چھوٹے، پھولے ہوئے غبارے کے ساتھ گلی ہوتی ہے۔ اس غبارے کی ہوانس سرخ کے ذریعے نکال دیتی ہے اور یہ کاٹھیٹر ٹیوب آپکے عضوہ تناول کے ذریعے آسانی سے باہر نکال دی جاتی ہے۔

کاٹھیٹر ٹیوب (مثانے میں ٹیوب) نکالنے کے بعد پیشاب کرتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے؟

کیونکہ غدو دیمانہ (پروستیٹ کے غدو دیمانہ) پر جلداب بھی ہتھوڑی حساس ہو گی تو پہلی کچھ بار جب

آپ پیشاب کریں گے تو آپ کو ہلاکا سا چھپن کا احساس ہو سکتا ہے۔ لیکن اسکے بعد یہ کم ہو جائے گا۔ شاید آپ کو پیشاب میں ہلاکا سا خون نظر آئے خاص طور پر اگر آپ رات بھروسے ہوں اور پانی یا کس قسم کا مشروب نہ پی سکے ہوں۔ کیونکہ آپ کے مثانے کے ٹھوٹوں کو پہلے رکاوٹ کی وجہ سے زیادہ زور لگا کر پیشاب کرنا لانا پڑتا تھا اس لئے پہلی کچھ بار میں آپ کو زیادہ زور سے پیشاب آنے کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیت اللہاء وقت پر نہیں بہنچ سکتے۔ مگر خوش قسمتی سے کافی جلد ہی مثانے کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ اب زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں اور یہ احساس کہ آپ نے جلد سے جلد بیت اللہاء جانا ہے ختم ہو جاتا ہے۔

کیا میں اپنا پیشاب قابو کر سکتا ہوں؟

جی ہاں! پروستیکٹومی کے آپریشن کے بعد مریض کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشاب پر قابو کر سکے گا یا نہیں۔ یہ صرف آپریشن کے بعد کچھ دنوں تک ہوتا ہے۔ جب مثانے کے پٹھ تھوڑا زیادہ زور لگانے کے عادی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو پہلے کافی عرصہ بڑھے ہوئے غدو دیمانہ کے پاس سے پیشاب کرنا لانا ہوتا تھا۔

پیشاب سے ناپاک یا گیلے ہونے کے ڈر کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟

کیونکہ مثانے کو پہلے ضرورت سے زیادہ زور لگانے کی عادت ہوتی ہے اس لئے اس کو یہ لیکس ہونے میں کچھ دن لگتے ہیں۔ اس دورانے میں حدائقی طور پر پیشاب سے گیلے ہونے سے یا اس کے ڈر پر قابو کرنے کے لئے آپ اپنے پیرینیل (عجان سیون) کے ٹھوٹوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ کاٹھیٹر ٹیوب نکالنے سے پہلے نرنسگ یا میڈیکل شاف آپکو ان کو مضبوط کرنے کی ورزش لکھائیں گے۔

کیا مجھے ہسپتال میں سارا وقت پانی پیتے رہنا چاہئے؟

جب کاٹھیٹر (مثانے میں لگی ہوئی ٹیوب) بہادری جائے گی تو آپ کو اگلے دن جا گئے ہی صبح سے پانی پینا ہو گا۔ رات کے کھانے کے بعد مشروبات نہ پین کیونکہ یہ آپ کے جسم میں رہے گا اور آپ کو رات کو اکثر بیت اللہاء جانے کے لئے اٹھنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپکی رات کی نیند اور آرام متاثر ہو گا۔

کاٹھیٹر (مثانے میں ٹیوب) نکالنے کے بعد کتنا پیشاب آئے گا؟

یہ آپکے پانی یا مشروب پینے کی مقدار پر مخصر ہے۔ مگر یہ 4-2 لیٹر کے درمیان ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جتنا بھی پیشاب کریں اسے نرنسگ شاف کو دکھانے اور مقدار کا تعین کرنے کے لئے رکھیں۔