

پھیپھڑوں کی ریڈ یو تھر اپی



شوكٽ خانم
میوریل کینسر ہسپتال
اینڈریسرچ سینٹر

Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre
7A Block R-3, Johar Town, Lahore, Pakistan.
Tel: 042 359 5000 | UAN: 111 155 555
www.shaukhanum.org.pk

روہ سکتے ہیں۔ ہم رسولی کے ارد گرد کی جگہوں پر ان ضمی اثرات سے بچنے کے لئے علاج کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔

سنس کی تکلیف

تابکاری سے سوزش (نمینا) اور پھیپھڑوں کا ورم (فائر ورم) ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً علاج ختم ہونے کے دو سے تین ماہ بعد تک ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لئے سنس کی ورزش کو سمجھنا ضروری ہے یادو کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے جس سے سنس میں تکلیف سے بچا جاسکتا ہے۔ آپ کی معانج ٹیم آپ کی مدد کرے گی۔

غذا کی نالی (ایسوسیس) کا تنگ ہونا

تابکاری سے غذا کی نالی تنگ ہو سکتی ہے۔ علاج کے مکمل ہونے کے بعد آگر آپ کو تین ماہ سے زائد تنگ نگھٹے میں تکلیف ہو تو علاج کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو مزید علاج یا معافی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ غذا کی نالی کو کشاہد کرنے کے لئے اینڈ سکوپی یا سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

دل

تابکاری سے دل کے ارد گرد کی جھلکی میں سوزش (پری کارڈیسیس) ہو سکتی ہے یا دل کے عضلات کمزور ہو سکتے ہیں (مائوپتیھی) جس کی وجہ سے سینے میں درد اور سنس میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ بہت معمولی حالات میں دل کو سپالائی کرنے والی خون کی نالیاں متاثر ہو سکتی ہیں اور دل کے دورے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔

پسلی کی ہڈی کی کمزوری

یہ شاز و نادر ہوتا ہے لیکن ریڈ یو تھر اپی سے کچھ پسلیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ شدید کھانسی کے بعد یا بلکہ ٹرام کے بعد سینے کا درد ہو سکتا ہے یا پسلی کا بلکا فر پکر بھی ہو سکتا ہے۔

ریٹھ کی ہڈی کا متاثر ہونا

یہ شاز و نادر ہوتا ہے اور آپ کے ریڈ یو گرافی کے عمل کو انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے بچا جاسکے۔ ریٹھ کی ہڈی کے متاثر ہونے سے چلنے میں مستقل تکلیف یا جسم کے نچلے حصے میں حساسیت کی کمی ہو سکتی ہے۔

ادویات اس میں مددگار ہوں گی۔ جسے آپ کا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ کھانے اور پینے سے پہلے بہیشہ باقاعدگی سے ادویات لیں۔

متلی (کمزوری محسوس کرنا)

آپ کے علاج کے دوران آپ کو متلی محسوس ہو سکتی ہے۔ کھانا پینا جاری رکھنا ضروری ہے۔ قلیل مقدار میں کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ اگر متلی جاری رہے یا آپ نے تھکرہ کر رہے ہیں تو برائے مہر یا انی اپنے تھر اپی ریڈ یو گرفر، نریس یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

کھانی

آپ کو تھک کھانی ہو سکتی ہے یا کھانی کے ساتھ خون آسکتا ہے۔ یہ معمول کے مطابق ہے۔ یہ کوئی مائع لینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو کھانی کی عمومی دوام ددیتی ہے۔ ریڈ یو تھر اپی سے ہونے والی بے چیزی علاج کے ختم ہونے کے کچھ ہفتوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی تھوک کارنگ بدلتے جائے، گاڑھی ہو جائے اور آپ کو بخار ہوتا پہنچانے معاون ریڈ یو گرفر کو آگاہ کریں۔ یہ انفیکشن کی علامت ہو سکتا ہے۔

سینے میں تکلیف

آپ کے علاج کے 24 گھنٹے بعد سینے کی تکلیف ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایک یا زائد مرال والے مریضوں کو یہ ہو سکتی ہے۔ یہ خود بخود یا کسی سادہ درختم کرنے والی دوست ختم ہو جانی چاہئے۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو علاج کے لئے پہنچنی کر ریڈ یو گرفر کو آگاہ کریں۔

حرارت اور کپکپی

عموماً ایک مرتبہ کے علاج والے مریض ریڈ یو تھر اپی مکمل ہونے کے ایک گھنٹا کے اندر کپکپی اور حرارت محسوس کر سکتے ہیں۔ درختم کرنے والی سادہ دوا جیسا کہ پیر اینٹا مول اور آرام سے الگ چوپیں گھنٹوں میں یہ ختم ہو جانی چاہئے۔

طویل مدتی تضمی니 اثرات

ریڈ یو تھر اپی کے ختم ہونے کے بعد طویل مدتی تضمیني اثرات ہمیں اور سالوں تک جاری رہتے ہیں۔ ان تاخیری تضمیني اثرات کو جانچنا بہت مشکل ہے لیکن اگر یہ وقوع پذیر ہو جائیں تو یہ مستقل

ضمیني اثرات

ریڈ یو تھر اپی کا عمل درد سے خالی ہوتا ہے۔ تاہم ریڈ یو تھر اپی سے متعلق کئی ضمیني اثرات موجود ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک مریض ان تمام ضمیني اثرات کو محسوس کرے۔

اگر اپنے علاج کے دوران کسی شے سے آپ کو منسلک، چاہے جتنا بھی خفیہ ہو، ہوتا پہنچنے تھر اپی ریڈ یو گرفر یا ریڈ یو تھر اپی نریس یا ڈاکٹر میں اپنے وزٹر کی مدد سے فون کر کے آگاہ کریں۔

اپنے علاج کے دوران سکرٹ نوشی سے ضمیни اثرات جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں اور ممکنہ حد تک معمول سے کہیں تکلیف دہ ہو سکتے ہیں اور آپ کے لئے ان سے پہنچا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم آپ کو

سکریٹ اوشی چھوٹنے کی صلاح دیتے ہیں۔ ہم خدمات سے رابطہ کے لئے آپ کی مدد کریں گے اور صلاح دیں گے۔

تھکن

آپ خاص طور پر علاج کے آخری مرحلہ میں تھکن محسوس کریں گے۔ نیند کو بحال کرنے کے لئے اپنے آپ کو مزید وقت دیں۔

جلدی ری ایکشن

جس گہہ پر علاج کیا جاتا ہے خاص طور پر پیٹھ پر وہاں کچھ لوگوں کو سکن ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ سرخ، نشک اور حساس ہو جاتی ہے یا پھنسنا شروع جاتی ہے۔ ریڈ یو تھر اپی کے عمل کے آغاز کے دو یا تین ہفتوں بعد اس جگہ پر ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ ریڈ یو تھر اپی کے مکمل ہونے کے کچھ ہفتوں تک یہ ری ایکشن جاری رہتا ہے۔

عگھلنے اور ہاضمے میں دشواری

اگر ریڈ یو تھر اپی آپ کی غذای نالی (ایو فیکس) پر کی جاتی ہے تو یہ تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ یہ علاج کے عمل کے دو سے تین ہفتوں تک ظاہر ہوتی ہے اور علاج کے ختم ہونے کے قریباً تین ماہ بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

گرم اور ٹھنڈے مشروبات سے ابھننا کریں۔ گرم مائعات زیادہ برداشت کے قابل ہیں۔ آپ کو خوراک کو نرم اور تر کرنے کی ضرورت ہو گی۔ درد دور کرنے والی ادویات اور اینٹا مول سے ہے۔

ریڈ یو تھر اپی واحد علاج کے طور پر دی جاتی ہے۔ روزانہ (پیر سے جمع) کی بنیاد پر نہیں سے تیس علاج (مرال) کئے جاتے ہیں جس کا دورانیہ ساڑھے چھٹے تک ہو سکتا ہے۔ اس علاج کا مقصود آپ کے پھیپھڑوں میں رسولی کی افزائش کو ممکن کرنا اور روکنا ہے۔ اسے بنیادی ریڈ یو تھر اپی کہتے ہیں۔

ریڈ یو تھر اپی اور کیمپو تھر اپی:

کبھی بکھار کیمپو تھر اپی ادویات کے ساتھ بنیادی ریڈ یو تھر اپی بھی دی جاتی ہے۔ اس سے یا تو رسولی کے سائز کو ممکن کیا جاتا ہے تاکہ ہم چھوٹی جگہ پر علاج کر سکیں اور یا ریڈ یو تھر اپی کی اثر پذیری کو بڑھایا جاتا ہے۔

ریڈ یو تھر اپی کے مرال سے پہلے (واقعی کیمپو تھر اپی) یا ریڈ یو تھر اپی کے عمل کے دوران (لازی کیمپو تھر اپی) کیمپو تھر اپی دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو واضح کرے گا کہ آیا کیمپو تھر اپی آپ کے لئے موزوں ہے کہ نہیں اور کس قسم کی کیمپو تھر اپی دی جائے گی۔

علامات کے علاج کے ریڈ یو تھر اپی

ایکی علامات جن سے آپ کو تکلیف ہوان کے علاج کے لئے بھی ریڈ یو تھر اپی دی جاتی ہے۔ ان علامات میں کھانی، سینے کی درد، سانس میں دشواری یا جب کھانی کے ساتھ آپ کو خون آئے شامل ہیں۔ اس قسم کی ریڈ یو تھر اپی کو تکسین بخشن علاج کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ یا 12 مرتبہ ریڈ یو تھر اپی دی جائے گی جو روزانہ کی بنیاد پر پیر سے جمع تک اڑھائی ہفتوں تک جاری رہے گی۔

سر جری کے بعد ریڈ یو تھر اپی

سر جری کے بعد باقی رہ جانے والے خود بینی خلیات کو ختم کرنے کے لئے ریڈ یو تھر اپی کا عمل کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ کا زخم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک علاج شروع نہیں کیا جائے گا۔ جلد بازی میں دی جانے والی ریڈ یو تھر اپی سے زخم مندل ہونے کا عمل آہستہ ہو جاتا ہے۔